

人乳腺癌细胞(HCC1569)



产品详情

产品货号	产品名称	规格
EC-HCC1569	人乳腺癌 HCC1569	1x10 ⁶

细胞介绍：

HCC1569 是从一名 70 岁黑人女性化生性癌患者的乳腺中分离出的上皮细胞系，该患者的 FHIT 基因存在种系突变，她的女儿也携带该突变。该细胞系于 1995 年启动，历时 19 个月建立。该患者之前接受过化疗，并且没有乳腺癌家族史。肿瘤被分类为 TNMIV 期 3 级化生癌，18 个淋巴结中有 4 个转移。细胞分化较差。细胞 Her2-neu 表达呈阳性，p53 表达呈阴性。HCC1569 上皮细胞特异性标记物上皮糖蛋白 2(EGP2) 和细胞角蛋白 19 呈阳性。通过免疫组织化学检测，细胞雌激素受体(ER)表达和孕激素受体(PR)表达均为阴性，但通过胞质蛋白测定可检测到低水平的 PR 表达。

细胞特性：

- **来源**：胸部; 乳腺组织
- **形态**：上皮样细胞贴壁和悬浮生长
- **含量**： $>1\times10^6$ 细胞数
- **规格**：T25 瓶或者 1mL 冻存管包装
- **用途**：仅供科研使用

运输和保存：

干冰运输及复苏好存活细胞：

- 1mL 冻存管包装干冰运输，收到后 -80 度冰箱保存过夜后转入液氮或直接复苏，若发现干冰已挥发干净、冻存管瓶盖脱落、破损及细胞有污染，请立即与我们联系。
- T25 瓶复苏的存活细胞常温发货，收到后按照细胞接收后的处理方法操作。

细胞接收后的处理：

- 收到细胞后，75%酒精消毒瓶壁将T25瓶置于37°C培养箱放置约2-3h，若发现培养瓶破损、有液溢出及细胞有污染，请拍照后及时联系我们。
- 请在4或5X显微镜下确认细胞状态，同时给刚收到的细胞拍照（10×，20×）各2-3张以及培养瓶外观照片一张留存，作为售后时收到时细胞状态的依据。
- 部分贴壁、部分悬浮生长细胞：T25瓶置于37°C培养箱中约2-3h，显微镜下观察细胞的情况，若细胞密度在60%以下，客户需收集T25瓶中的悬浮细胞离心后用完全培养基重悬后打回到原培养瓶中继续培养，若细胞生长70%-90%对细胞进行传代，传代时需要收集培养基中悬浮的细胞离心后回收。
● 备注：运输用的培养基（灌液培养基）不能再用来培养细胞，请换用按照说明书细胞培养条件新配制的。

一. 培养基及培养冻存条件准备

- 准备RPMI 1640培养基；优质胎牛血清，10%；双抗，1%。
- 培养条件：气相：空气，95%；二氧化碳，5%。温度：37°C，培养箱湿度为70%-80%。
- 冻存液：90%血清，10%DMSO，现用现配。

二. 细胞处理：

● 冻存细胞的复苏：

将含有1mL细胞悬液的冻存管在37°C水浴中迅速摇晃解冻，加入到含4-6mL完全培养基的离心管中混合均匀。在1000RPM条件下离心3-5min，弃去上清液，完全培养基重悬细胞。然后将细胞悬液加入含6-8ml完全培养基的培养瓶（或皿）中37°C培养过夜。第二天显微镜下观察细胞生长情况和细胞密度。

● 细胞传代：如果细胞密度达70%-90%，即可进行传代培养。

该细胞为部分贴壁部分悬浮细胞，传代可以参考以下方法：

1. 收集：将培养瓶中的悬浮的细胞收集到离心管中。用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。由于细胞贴壁不牢PBS润洗后细胞会脱落所以PBS也要回收到离心管中。

2. 加入 0.25% (w / v) 胰蛋白酶-0.53 mM EDTA 于培养瓶中 (T25 瓶 1-2mL , T75 瓶 2-3mL) 置于 37°C 培养箱中消化 1-2 分钟(难消化的细胞可以适当延长消化时间), 然后在显微镜下观察细胞消化情况 , 若细胞大部分变圆并脱落迅速拿回操作台 , 轻敲几下培养瓶后加入 3-4ml 含 10%FBS 的培养基来终止消化。

3. 将收集到的悬浮细胞、 pbs 清洗液中的细胞和消化下来的贴壁细胞以 1000rmp/ml 离心 5min , 弃去上清 , 补加 1-2mL 培养液后重悬混匀后将细胞悬液按 1 : 2 的比例分到新 T25 瓶中 , 添加 6-8ml 按照说明书要求配置的新的完全培养基以保持细胞的生长活力 , 后续传代根据实际情况按 1:2~1:5 的比例进行。

- **细胞冻存:** 收到细胞后建议在培养前 3 代时冻存一批细胞种子以备后续实验使用。下面 T25 瓶为例 ;

1. 细胞冻存时按照细胞传代的过程收集消化好的细胞到离心管中 , 可使用血球计数板计数 , 来决定细胞的冻存密度。一般细胞的推荐冻存密度为 $1\times10^6\sim1\times10^7$ 个活细胞/ml。

2. 1000rpm 离心 3-5min , 去掉上清。用配制好的细胞冻存液重悬细胞 , 按每 1ml 冻存液含 $1\times10^6\sim1\times10^7$ 个活细胞/ml 分配到一个冻存管中将细胞分配到冻存管中 , 标注好名称、 代数、 日期等信息。

3. 将要冻存的细胞置于程序降温盒中 , -80 度冰箱中过夜 , 之后转入液氮容器中储存。同时记录好冻存管在液氮容器中的位置以便后续查阅和使用。

注意事项 :

- 所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性 , 必须在二级生物安全台内操作 , 并请注意防护 , 所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。
- 建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、 衣服和戴上防护面罩。注意 : 冻存管浸没在液氮中会泄漏 , 并会慢慢充满液氮。解冻时 , 液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子 , 从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。
- 本产品仅限于科研使用 , 不得用于医药、 临床诊断或治疗、 食品或化妆品等用途。
- 请勿存放于普通住宅区。
- 为了您的安全健康 , 请穿好实验服并佩戴一次性口罩和手套进行操作。

- 实验结果受多种因素影响，相关处理仅限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话：13564444959

官网：www.followme-shop.com

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服