

阿佛丁,即用型三溴乙醇溶液 2.5%(大鼠)


[产品详情](#)

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
S19686	阿佛丁,即用型三溴乙醇溶液 2.5%(大鼠)	常温避光	1年

产品应用:

仅用于大鼠麻醉(大鼠麻醉剂为浊液状态属正常, 使用前一定要混匀)。

推荐麻醉计量:

请提前做预实验确定剂量, 推荐大鼠注射剂量为 10ul/g, 腹腔注射。

(如用于小鼠请购买货号 S19536, 1.25%阿佛丁(三溴乙醇)即用型无菌溶液)

麻醉起效时间:<5min

麻醉维持时间:30-50min

使用方法:

1. 用 1ml 注射器抽取麻醉剂, 排空气泡。
2. 抓住大鼠, 使其呈头朝下, 尾朝上, 以便让腹腔的脏器顺势倒向头胸部, 减少刺伤脏器的机会。
3. 选择大鼠的左侧或者右侧的下腹部为穿刺点, 避开肝脏和较低中腹部膀胱。将已经抽取好的药物针尖水平刺入皮肤内后, 调整角度, 使针头与腹部呈 45°, 刺透腹膜进入腹腔, 缓缓地推入药液, 注射后缓慢退出针头。
4. 给药后做好保温工作, 减轻动物因体温下降导致的寒颤。
5. 麻醉后动物自然倒下, 头、四肢、尾巴、胡须无触碰反应, 仰卧时心跳及呼吸均匀, 肌肉松弛视为达到完全麻醉状态, 可进行后续实验操作。



注意事项:

1. 开封后推荐 2 周内使用完毕。
2. 使用前请务必确定标签上保质期, 并观察是否变色或有结晶析出。如果有晶体吸出, 可以 37 度水浴溶解。
3. 正式实验前请先进行预实验。
4. 使用量需根据实际情况自行调整, 如果需要延长麻醉时间, 可按初始剂量 1/3 补打, 请实验者根据需求进行预实验。
5. **本品为非管制药物。**
6. 本产品仅限于专业人员的科学的研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
7. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
8. 实验结果受多种因素影响, 相关处理仅限于产品本身, 不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话:13564444959

官网:www.followme-shop.com

地址:北京市海淀区东北旺西路 58 号尚科办公社区 C 区一楼



公众号



客服