

RFC2(17Z7)Rabbit Monoclonal Antibody



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
IM40013	RFC2(17Z7)Rabbit Monoclonal Antibody	−20°C	1年

产品概述:

产品货号	IM40013	
别名	RFC40	
产品名称	RFC2(17Z7)Rabbit Monoclonal Antibody	
类别	抗体产品	
推荐应用	WB, IF-ICC, FCM	
反应种属	Human, Mouse, Rat	
存储缓冲液	Supplied in 50mM Tris-Glycine (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% New type preservative N and 0.05% BSA.	
免疫原	A synthetic peptide of human RFC2	
稀释度	WB 1:1000-1:5000, IF-ICC 1:100-1:200, FCM 1:10-1:100	
参考分子量	39kDa	
预测分子量	39kDa	
运输及保存条件	-20°C/1 year	
宿主	Rabbit	
同种型	IgG	



	This gene encodes a member of the activator 1 small subunits family.	
	The elongation of primed DNA templates by DNA polymerase delta and	
	epsilon requires the action of the accessory proteins, proliferating	
	cell nuclear antigen(PCNA) and replication factor C(RFC).	
	Replication factor C, also called activator 1, is a protein complex	
背景介绍	consisting of five distinct subunits. This gene encodes the 40 kD	
	subunit, which has been shown to be responsible for binding ATP and	
	may help promote cell survival. Disruption of this gene is associated	
	with Williams syndrome. Alternatively spliced transcript variants	
	encoding distinct isoforms have been described. A pseudogene of this	
	gene has been defined on chromosome 2. [provided by RefSeq, Jul 2013].	
纯化	Affinity Purification	
Uniprot ID	P35250	
Gene ID	5982	
Clonality	Monoclonal	

注意事项:

- 1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注,基本为非无菌包装,若用于细胞实验,请提前做好预处理。需低温保存的产品,一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
- 2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4. 实验结果受多种因素影响,相关处理仅限于产品本身,不涉及其他赔偿。

免责声明: 所有产品仅用作科学研究,不得用于其他用途! 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: www.followme-shop.com

地址:北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼





公众号

安 眠